Castilla-La Mancha

ANEXO VI

Protocolo de urgencias

(ante cualquier tipo de duda se avisará a los padres y/o 112)

NIVEL DE GLUCOSA	ESTADO	PAUTA A SEGUIR
"LO" (↓ 40) CON PERDIDA DE CONCIENCIA	Muy peligroso	► **AVISAR INMEDIATAMENTE AL 112** ► **INYECTAR GLUCAGON**: media ampolla (o,5 mg) en menores de 6 años y la ampolla entera (1mg) en niños de 6 ó más años ► **NO DAR NADA POR BOCA** ► **AVISAR A LOS PADRES**
" LO" (↓ 40) sin pérdida de conciencia"		► **Avisar a los padres** ► **Avisar al 112** - Dar 100 ml de zumo + 1 azucarillo - Si se resiste poner miel en las encías - Reposo, no hacer ejercicio
Entre " LO" (↓ 40) - 65	Bajo	► **Avisar a los padres** ► **Avisar al 112** - Dar 100 ml de zumo + 1 azucarillo - Reposo, no hacer ejercicio
Entre 65 – 100	Algo Bajo	► **Avisar a los padres** - Dar 100 ml de zumo + equivalente a 1.5 raciones - Reposo, no hacer ejercicio
Entre 105 – 130	Bien	Dar equivalente a 2 raciones
Entre 135 – 150	Normal	Dar equivalente a 1.5 raciones
Entre 155 – 175	Regular	Dar equivalente a 1 ración
Entre 180 – 250	Alto	Dar equivalente a 0.5 raciones REPETIR TRAS 1 – 1.5 horas
Entre 250 – 300	Muy alto	No ofrecer alimentos, excepto agua Reposo, no hacer ejercicio ► Avisar a los padres
Entre 301 – 400	Peligroso	No ofrecer alimentos, excepto agua Reposo, no hacer ejercicio ► Avisar a los padres
Entre 400 – "HI" (↑ 400)	Peligroso	No ofrecer alimentos, excepto agua Reposo, no hacer ejercicio ► **Avisar a los padres** ► **Avisar al 112**
Entre 400 – "HI"(↑400) Con pérdida de conciencia COMA	Muy peligroso	► **AVISAR INMEDIATAMENTE AL 112** ► **Avisar a los padres**